








## DOSEERADVIES POSACONAZOLE

### In te vullen door secretariaat laboratorium

Patiënt			LABETIKET
Staalnummer			
Antimycoticum		Posaconazole (1826)	


### In te vullen door de prikker

Gewicht		kg
Dosis		mg
Tijdstip laatste toediening		uur

Afname spiegel (bij voorkeur max ½ uur voor eerste toediening van de dag = dalspiegel)*		uur
---	---	-----

\* AZ Sint-Lucas: dalspiegel trachten te prikken. Indien echter op dezelfde dag andere analyses gepland zijn, nooit afname na 9u (wegens vertraging resultaten andere analyses). Bij patiënten straat 57 geen rekening houden met afnamemoment.

### In te vullen door microbioloog

Resultaat		µg/ml
-----------	---	-------

#### ADVIES

Streefwaarde voor profylaxie: >0,7 µg/mL

- Dalspiegel boven streefwaarde. Huidige dosering mag aangehouden worden. Controle spiegel eventueel na 14 dagen in te plannen.
- Te lage spiegel. Sluit interacties met co-medicatie uit. Toediening bij de maaltijd met zuurhoudende drank (cfr. Tips voor patiënten die Noxafil nemen)? Indien geen eetlust, eventueel toedienen met voedingssupplementen.