










DOSEERADVIES VORICONAZOLE

In te vullen door secretariaat laboratorium


Patiënt			LABETIKET
Staalnummer			
Antimycoticum		Voriconazole (1825) <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> per os	

In te vullen door de prikker

Gewicht			kg
Dosisinterval	12		uur
Dosis			mg
Tijdstip 1 ^{ste} toediening			uur
Tijdstip 2 ^{de} toediening			uur

Afname dalspiegel (maximum ½ uur vóór volgende toediening)			uur
--	---	--	-----

In te vullen door microbioloog

Resultaat			µg/ml
-----------	---	--	-------

ADVIES

Referentie-interval: 1 – 5,5 µg/mL

Streefwaarde: 2-5.5 µg/mL

- Dalspiegel binnen referentie-interval. Huidige dosering mag aangehouden worden. Controle spiegel eventueel na 14 dagen in te plannen.
- Toxische spiegel. Pas de dosis aan en controleer de dalspiegel 4 dagen na dosisaanpassing.
- Subtherapeutische spiegel.
Correcte dosis ifv lichaamsgewicht? Nuchtere toediening indien perorale therapie?
Sluit interacties met co-medicatie uit. Verhoog de dosis en controleer de dalspiegel na 4 dagen dosisaanpassing.